

新型インフルエンザの流行によりタミフルドライシロップ 3%が入手困難なケースでタミフルを処方する場合、タミフルカプセル 75mg を脱カプセルし、タミフルドライシロップ 3%の用法・用量に従い投与出来ることを、厚生労働省は事務連絡で周知しております。

【参考】 タミフルカプセル 75 を脱カプセルした場合の体重別用量早見表

体重(kg)	1日投与量(2分服)			5日間投与量						
	オセルタミビル(mg)	カプセル数	カプセル内容物の重量(mg)	カプセル数	カプセル内容物の重量(mg)	薬価(¥309.1/p)	3%に賦形した場合の投与量※1(g)	乳糖(mg)	10%に賦形した場合の投与量※2(g)	乳糖(mg)
9	36	0.48	79.20	2.4	396	741.8	6.00	5604	1.80	1404
10	40	0.53	88.00	2.7	440	824.3	6.67	6230	2.00	1560
11	44	0.59	96.80	2.9	484	906.7	7.33	6846	2.20	1716
12	48	0.64	105.60	3.2	528	989.1	8.00	7472	2.40	1872
13	52	0.69	114.40	3.5	572	1071.5	8.67	8098	2.60	2028
14	56	0.75	123.20	3.7	616	1154.0	9.33	8714	2.80	2184
15	60	0.80	132.00	4.0	660	1236.4	10.00	9340	3.00	2340
16	64	0.85	140.80	4.3	704	1318.8	10.67	9966	3.20	2496
17	68	0.91	149.60	4.5	748	1401.3	11.33	10582	3.40	2652
18	72	0.96	158.40	4.8	792	1483.7	12.00	11208	3.60	2808
19	76	1.01	167.20	5.1	836	1566.1	12.67	11834	3.80	2964
20	80	1.07	176.00	5.3	880	1648.5	13.33	12450	4.00	3120
21	84	1.12	184.80	5.6	924	1731.0	14.00	13076	4.20	3276
22	88	1.17	193.60	5.9	968	1813.4	14.67	13702	4.40	3432
23	92	1.23	202.40	6.1	1,012	1895.8	15.33	14318	4.60	3588
24	96	1.28	211.20	6.4	1,056	1978.2	16.00	14944	4.80	3744
25	100	1.33	220.00	6.7	1,100	2060.7	16.67	15570	5.00	3900
26	104	1.39	228.80	6.9	1,144	2143.1	17.33	16186	5.20	4056
27	108	1.44	237.60	7.2	1,188	2225.5	18.00	16812	5.40	4212
28	112	1.49	246.40	7.5	1,232	2307.9	18.67	17438	5.60	4368
29	116	1.55	255.20	7.7	1,276	2390.4	19.33	18054	5.80	4524
30	120	1.60	264.00	8.0	1,320	2472.8	20.00	18680	6.00	4680
31	124	1.65	272.80	8.3	1,364	2555.2	20.67	19306	6.20	4836
32	128	1.71	281.60	8.5	1,408	2637.7	21.33	19922	6.40	4992
33	132	1.76	290.40	8.8	1,452	2720.1	22.00	20548	6.60	5148
34	136	1.81	299.20	9.1	1,496	2802.5	22.67	21174	6.80	5304
35	140	1.87	308.00	9.3	1,540	2884.9	23.33	21790	7.00	5460
36	144	1.92	316.80	9.6	1,584	2967.4	24.00	22416	7.20	5616
37	148	1.97	325.60	9.9	1,628	3049.8	24.67	23042	7.40	5772
37.5	150	2.00	330.00	10.0	1,650	3091.0	25.00	23350	7.50	5850

- 1カプセル中、オセルタミビルとして75mgを含有し、カプセル内容物の重量は165mgです。
- ※1 3%の賦形：日本病院薬剤師会のホームページで紹介されている調剤方法です。
- ※2 10%の賦形：中外製薬の「脱カプセル後の安定性試験」実施時の調剤方法です。
- 薬価は2009年11月時点です。

【参考】 乳糖賦形時の予製方法

カプセル数	オセルタミビル(mg)	カプセル内容物の重量(mg)	乳糖賦形時の全量(g)	
			3%	10%
1	75	165	2.50	0.75
4	300	660	10.00	3.00
10	750	1,650	25.00	7.50
12	900	1,980	30.00	9.00
50	3,750	8,250	125.00	37.50
100	7,500	16,500	250.00	75.00

12カプセルはタミフルドライシロップ 3%の1瓶(30g)と同量となります。